

IMED – Passo Fundo-RS

TRATAMENTO ENDODÔNTICO DO SEGUNDO MOLAR SUPERIOR APRESENTANDO HIPERPLASIA PULPAR

CORÁ, rafaela¹; ORSO, eloise²; SOLDA, caroline³

rafaelapcora@outlook.com

¹ CORÁ, rafaela Graduanda em Odontologia, Faculdade de Odontologia, IMED, Passo Fundo, Brasil.

² ORSO, eloise Graduanda em Odontologia, Faculdade de Odontologia, IMED, Passo Fundo, Brasil.

³ SOLDA, Caroline Dra. em odontologia, Faculdade de Odontologia, IMED, Passo Fundo, Brasil.

O presente trabalho, relata o caso de um paciente diagnosticado com pulpíte sintomática com a presença de pólipos pulpar, no segundo molar superior esquerdo, o qual apresenta uma anatomia diferenciada com apenas 2 raízes e 2 canais radiculares. Diante do quadro do paciente, foi realizado a remoção do pólipo pulpar, seguido do tratamento endodôntico em duas sessões com o uso da instrumentação recíproca. Portanto, o diagnóstico inicial mostrou-se de grande importância para a resolução do caso assim como a técnica de instrumentação utilizada, levando ao sucesso do tratamento.

Palavras-chave: pólipo; hiperplasia; polpa